

2
DISSERTATIO

INAUGURALIS MEDICA

DE

DIARRHOEA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

**MAGNIFICI DOMINI PRAESIDIIS AC DIRECTORIS,
SPECTABILIS DOMINI DECANI, NECNON CLARISSIMORUM
DD. PROFESSORUM**

PRO

DOCTORIS MEDICINAE LAUREA,

**SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS
AC PRIVILEGIIS RITE OBTINENDIS**

IN

**ALMA AC CELEBERRIMA REGIA
SCIENTIARUM UNIVERSITATE PESTIENSI,
PUBLICAE DISQUISITIONI**

SUBMITTIT

ISAACUS BINNENFELD,

HUNGARUS BACSIENSIS.

**Theses adnexae publice defendentur in aedibus
Universitatis die Aprili 1845.**

BUDAE,

TYPIS J. GYURIÁN ET M. BAGÓ.

ORVOSI ÉRTEKEZÉS

A

H A S M E N É S R Ő L.

ORVOSTUDORRÁ

AVATTATÁSA ÜNNEPÉLYÉRE

IRTA

BINNENFELD IZSÁK

BUDÁN,

NYOMATOTT GYURIÁN ÉS BAGÓ BETÜIKKEL.

Unum quemque oportet in hoc studio versatum symbolum
aliquod, etsi exiguum, in commune Medicinae aerarium contri-
buere.

Duncani oratio de laud. Harvei.

SEINEM
VIELGELIEBTEN SCHWAGER
HEINRICH REDLICH
UND
DESSEN GEMAHLIN
SEINER INNIGSTGELIEBTEN SCHWESTER
R O S A L I A

widmet diese Blätter als Zeichen wahrer Liebe und
Achtung

der Verfasser.

DECLARATION

of the

CONFERENCE

A' hasmenésről.

Hasmenés, hasfolyás, (Diarrhoea, alvi profluvium, defluxio) alatt különböző nemű bántalmak értetnek, mellyeknek egy közös kórjelök, a gyakori székkiürítésben, s a kiürített anyag folyóságában áll. A hasmenés tehát nem állományi betegség — morbus substantivus, — hanem legtöbbszörre különféle kóros bántalmak tüneténye. És minthogy fölötté különböző nemei vannak a hasmenésnek, könnyebb áttekintét végett, azokat mind kórjeltani, mind pedig kórokbeli szempontból vendem tárgyalás alá.

A hasmenést legtöbb esetben bizonyos kórjelek előzik meg, minők: az emésztési zavar, a közérzet megváltozása, szélkórosan felpuffadt és feszült has, felbőgés, a fej nehézsége, száj' szárazsága, szomj, émelygés, ökröndözés, nehézség érzete az ágyék és czombtájon, kedvetlenség, ide, s tova bolygó fájdalom, vagy szurd fájdalom a hasban, és ezek után áll be a székkiürítés minden erőltetés nélkül, melly gyakran igen híg és többször vissza tér 5—30—50-szer naponta, gyakran minden székkiürítés után könnyebbülést, és fájdalom enyhülést érez a beteg.

A székkiürítés rendellenessége vagy a kiürített anyag mennyi- és minőségében, vagy pedig azon időben állhat, melly alatt e kiürítések történnek, s innét különféle nemeit különböztetjük a hasmenésnek.

Bélsárféle hasmenésnek (Diarrhoea stercoralis) mondatik a hasfolyás azon neme, midőn a' kiürített anyag

lágysabb állományu és rendes színezetű; vagy pedig midőn emésztetlen anyag ürített ki ésez lépes hasmenésnek (*D. lenterica*) neveztetik. A kiürített anyag továbbá lehet, epés, savós, nyákos, fehérs, táphoz hasonló, lehet rozsdás, genyes, eves, savtartalmu, csipős marós, álhártyákkal, vérrel, férgekkel vagy legalább azok maradványaival vegyes.

A folyó sárga, vagy sárgás-zöld epetartalmu kiürítések epés hasmenés névvel bélyegeztetnek. Gyakran izgatottságból származnak, miáltul a máj elválasztási működése felmagasztaltatik, ezen esetekben az epe minőségileg is megszokott változni.

Ha savós folyadék ürített ki savós hasmenésnek mondatik, ez többnyire a bélhuzam nyákhártyájának kóros terménye, melly annak kórosan erősebb küzzadásában áll, hasonló az orrnáthához és sokaktól bélhuzamhurutnak neveztetik. E hasmenés gyakran hascsikarással s a bélhuzamon elterjedő fájdalokkal jár és azt meghűtés okozza, miért is Csúzos hasmenésnek mondatik; néha vízkórosoknál a felszívódott savóbol veszi eredetét, gyakrabban a bélhuzam nyákhártyájának zsonghiányából — atonia) származik, főleg öregeknél, mikor is zsongtalan vagy szélhűdési hasmenés névvel bélyegeztetik. A kiürített anyag ilyenkor vizes savós és hig bélsárral vegyült, máskor barnás, halvány szürkés, néha fehérs, pernyékkal — albuminosis floccis — vegyült, gyakran igen bő mennyiségben és egymás után hamar ürített ki.

A nyálkás folyadék kiürítése, vagy is a nyálkás hasmenés, a bélhuzam nyákhártyája tüzűinek — folliculi — kórosan öregbedett elválasztásában áll, és többnyire a hurkabél gyuladásának tüneténye, első esetben az érverés változatlan, s a bőr hús, de a szomszoros nagyobbodott, s a beteget igen erős hascsikarásos fájdalma kinozzák, a kiürítmény átlátszó, tapadós nyálkból

álló, melly nyák fehér pernyék alakjában ülepszik le az edény fenekére, néha bűdös, máskor szagnélküli.

Tápfolyás (*Chylorrhoea*, *fluxus Coeliacus*) a nyálkás hasmenés nemének tekintendő; nevezetét a táphoz hasonló fehér szürkés tejféle kiürítménytől vette, mit a régiek valódi tápnak tartottak, azonban ez nem egyéb a bélhuzami megváltozott nyáknál, vagy bélsárnál, mellynek színe az epe mennyi vagy minőségi hibájától vagy a vele összegyült genytől függ.

Néha az elválaszték úgy néz ki mint a vízzel összekevert mész, Gypszféle hasmenés (*D. gypsea*), mellyet Mason Good észlelt, gyakran vétetik az észre kisdedeknél, s olly egyéneknél kik sokáig meleg tartományokban éltek, vagy májbajokban szenvedtek.

Néha az elválasztékban nagyobbodott képlékenység észlelhető, álhártyák képződésében külekezvén, mellyek a kiválaszték által különböző alakban majd pernyék, majd a bélhuzamhoz hasonló üres csövecskék alakjában ürítetnek ki. Csövecskés hasmenésnek (*D. tubularis*) nevezetik M. Goodtól, s néha a béllob tüneténye, azonban a nélkül is előfordul, s akkor valószínűleg a nyák-hártya rendellenes elválasztásának terménye. Ez idült betegség, melly rendetlen székkiürítésekkel, székszorulásokkal, emésztési zavarokkal, az idegrendszer kóros bántalmaival, nőidegkórral — *hysteria* — és rásztkórral — *hypochondria* — szokott párosulni. Efféle székkiürítések után a betegek gyakran enyhülést éreznek.

A rothadt, hullaszerű — *cadaverosus* — kiürítések többnyire általános rothadás következményei, vagy pedig a fenés vagy fekélyesedett kiválasztó részek helybefüloldozásából veszik eredetöket. Ide számítandó a régiek májfolyása — *fluxus hepaticus* — mellynek kórjele húsmosadékhoz — *lotura carnis* — hasonló eves kiürítmény, mi nem mindig függ ugyanegy okból, hanem

gyakran elfajulásokban alapszik, melyek elvégre is sorvasztó lázat és halált okoznak.

A szürkés vagy fehéres agyagos kiválasztások, többnyire az epének bélhuzamba való elnyomott vagy megakadályozott kiürítéséből származnak s a kiválasztékban hiányzó epefesteny hozza elő a kiürítmény említett színét, melly kiürítmény néha folyó is szokott lenni.

Zöldes vagy zöldes-sárgás kiürítések gyakran a bélhuzam lobos bántalmának tünetényei, és így nem mindig az epe rendellenes elválasztásából veszik eredetöket; főleg gyomor — vagy bélellágyulásban szenvedő gyermekeknél fordulnak elő közönségesen, és szigoruan megkülömböztetendők az édes higany által előhozatniszokott hasmenésektől, miután ezekhez hasonló színezetűek.

Megemlítést érdemel még a kiürítmények azon alakja, melyet már a régi orvosok észleltek és hájas hasmenés névvel (*D. adiposa*) bélyegeztek, midőn a kiürítményben majd folyó, majd félfolyó s vajhoz hasonló, majd merő s borsónagyságtól diónyi nagyságig menő gömbölyű alakban zsiradék találtaik. E zsiradék nem az olajos eledelekből, hanem inkább magokban a belekben támadó saját korfolyamból veszi eredetét, s ha folyó állományu, akkor bélsáros kiürítmény fölületén uszik, s azt vékony bőr gyanánt borítja be s az edény' széleihez tapad. Brandes által tett kísérletek nyomán: Elaina, Stearina és Sárga anyagból áll. Gyakrabban fordul elő e hasmenés nőknél, mint férfiaknál; különféle kórok jelenlétét akarták innét következtetni, minők: a máj, gyomornyálmirigy' bántalmai, azonban gyakran ezek nélkül is előfordul. Mások ismét a nyombélben — *in intestino duodeno* — keresték e hasmenés' fészket, azonban csak a későbbi szigoru vizsgálatok fognak e részben felvilágosítást nyújtani. Bright és Eliotson nagyhirű férfiak a hájas hasmenést mézes húgyárral tapasztalták szövetkezve.

A genyes hasmenést nehezen lehet megkülömböztetni a nyálkástól s a fehérnyés tartalmuaktól. A hol a bélhuzam nyákhártyája fekélyesedett, ott a kiürítményben csak nehezen lehet megkülömböztetni a genyt. A geny nagy mennyisége a kiürítményben vagy a lépben, májban bélfodorban — mesenterium — vagy pedig a hashártya sejtszövetében létező tályogokból származik, melyek miután a belekkel összenöttek ezekbe kiürülnek.

Véres hasmenés (*D. cruenta*) az midőn a kiválasztékkal vér ürítetik ki, a nélkül hogy a kiürítmény orr, száj, — gyomor — vagy tüdő vérzésnek, vagy aranyérnek volna következménye, miután ezen betegségek tüneteményei közül egy sem észlelhető, előfordul az ujszüötteknél, s ekkor veszedelmes, néhány nap alatt a kisdedet megöli. Ezen ritka betegség természetét még homály fedi. Nem minden ujszüölttek véres hasmenése ily veszedelmes, W. Schmidt azt állítja, hogy az gyakran az anya emlőbimbójából szopott vér által, néha pedig tej vagy étel által okozott izgatottság következményeként hozatik elő, mikor aztán hasgörcsök és csikarások között vér ürül ki a végbélen keresztül s a kisdetek meggyógyulnak. Megletteknél az efféle hasmenés a súlygyuta veszedelmes tüneteménye.

A hasmenés néha mérsékelt, másszor kimerítő, mely utóbbi olvasztó hasmenés név alatt — (*D. colliquativa*) ismeretes. A hasmenés néha éjjeli néha meg nappali, a belek kifekélyzése által támadt hasmenés többnyire éjjel fordul elő.

Bonczani bélyegek.

A hullában ritkán vehetők észre világos változások, vagy ha előfordulnak is azok, inkább a bántalom hosszabb ideigi tartásának következményeül, sem mint annak okául tekintendők. Gyakran a bélhuzam nyákhártyája halvány, vértelen, a nyákhártya alatti sejtszövet

kisse' beszűrődött, az izomrostok halványak és lágyak, a nyákelválasztó tüszők a rendesnél inkább kifejlődtek. Néha a nyákhártya ellágyult beszűrődött, pontokkal pettegetett vagy megkeményült, a sejtszövet meg nyákhártya túltenyészett — hypertrophica —, a nyákhártya felülete többé kevesbé sűrű nyákkal fedett. Paehion mirigyei sötétebb színűek, duzzadtak, sőt kifekélyesedettek is lehetnek. A bélhuzam több helyen majd megszűnik, majd ismét kitágultnak találhatjuk. Kisdedeknél gyakran gurdélyok — diverticula — találhatunk. Azon elsőrendű betegség melly a hasmenést okozza, különféle változásokat hozhat elő a bélhuzamban.

K ó r i s m e.

Már fentebb megemlítettük azon tüneteményeket, melyek a hasmenést megelőzni és követni szokták, helyén leend tehát most azon különbségeket is megemlíteni, mellyek a hasmenés és ehhez hasonló bántalmak között létezik, hogy a kórisme annál könnyebben kitűnjék. Föl lehetne ugyan is cserélni a hasmenést: vérhassal — dyssenteria —, choleraival, vagy béllobbal.

A vérhas a hasmenéstől abban különbözik, hogy ez utóbbinál nincs erőltetés — tenesmus — mi azonban a vérhasnál más ideges tüneteményekkel, görcsökkel, minő a vizellet csepegés — stranguria — párosulva szokott előfordulni, továbbá különbözik az, az erős külső nyomás iránt mutakozó nagy érzékenység a folytonos székkiürítési erőködés által, midőn mindig csekély mennyiségű vér ürítetik ki, csaknem minden bélsár nélkül, végre különbözik a láz által melly a vérhast követni szokta. A choleraól pedig megkülömböztethető a következő hányás, a baj gyorsabb és hevenyebb lefolyása, a nagy mennyiségű kiürítmény, az erő gyors kimerülése s a végtagok görcsei által. — A béllob bélyegző kórjele a has fájdalma tapintat alatt, erős láz, nagy hőség, vő-

rös nyelv, lángszinü vizellet s t. e. melly kórjelek a hasmenés lényegéhez nem tartoznak.

A hasmenés okai, és annak kórszármaszilag különböző nemei.

A hasmenés legközelebbi oka úgy látszik a tápvo-
nal fölmagasztalt működésében áll, és pedig mind a
rendszerinti — peristalticus — mozgást, mind pedig az
elválasztó edények munkásságát illetőleg. E fölmagasztalt
munkasság pedig különféle okból származhatik,
vagy az izgató anyagok rendellenes mennyi és minőségétől,
vagy a bélhuzam idegeinek rendellenes érzékenysé-
géből, vagy pedig a visszasugárzó idegek fölmagasztalt
izgékonyaságától.

A kisdedkorban gyakran fordul elő hasmenés, mint-
hogy a kisdedek bélhuzama folytonos növekvésben le-
vén mindig izgékonyaságnak van alávetve. Az alkalmi
okok közé tartozik pedig: a rossz tej anyáé vagy daj-
káé legyen az, a szopó kisded hasmenése — *D. lactan-*
tium —, ha a kisdedek erősen tápláltatnak, az első utak
savanyodása; kora elszoktatása a kisdedeknek az emlék-
től, s más ételekre való átmenetel, mellyek a gyöngé
kisded emésztési műszerkezetének nem felelnek meg;
az elválasztott kisdedek hasmenése — *D. alblactatorum* —,
továbbá a fogzás is izgatottságát hozzá elő a belhuzam-
nak, s előáll az úgy nevezett fogzási hasmenés — *D.*
dentitionis —. A kisdedek béllobja is hozhat elő hasme-
nést. A kiürített anyag pépállományu félfolyó, szürkés
hamuszinü agyagos, néha a vágott tojáshoz hasonló,
zöldes, nyálkás, gyakran sötét barna pernyékkal ve-
gyült, sajtos vagy bűdös lehet. A savtartalmu kiürit-
mény zöld sárgás szine s vágott tojáshoz hasonló sajtféle
állománya által tűnik föl, szaguk savanyu és savkém-
letűek is — *reagunt acide*. — Az efféle székkiürítés igen

erős hasgörcsös fájdalmakkal s erőtetéssel jár, a kisdedek többnyire jajgatva kiabálnak nyughatatlanok, s midőn e fájdalmak megújulnak, lábaikat a has felé vonják.

A fogzási hasmenést a fogzási tüneteményekről ismerhetni meg, minők: a száj hűsége, az iny vörössége. E hasmenés legjobb befolyással van a fogzásra, minthogy a bélhuzam felé nagyobb a vértorlódás, és így a nedvek elvonulnak az agy és gerinczagtól, mi által könnyebben történik a fogak kinövése, ritkábbak ekkor a görcsös rángatódzások s ez az oka aztán, hogy az anyák is elhanyagolják azt, elég kárára a kisdednek, miután a túlságos hasmenés erőkimerítést, és különféle más bajokat hoz elő, mint gyuladást, a vékonybél egyik részének betüremelését — intussusceptio — mit hullákban gyakran találhatni. Ha heveny volt a hasmenés, akkor többnyire a savós véres kiürítések tompasággal, görcsökkel s az agybani savós kiömlénnyel halált okoznak. Ha pedig idült lefolyásává válik, akkor szájzsebrék, lázas bántalmak s az olvasztó láz által halál hozatik elő.

A különneü alkalmi okok által a hasmenésnek következő nemei támadhatnak:

Csorvás hasmenés (*D. saburralis seu crapulosa*), nagy étkü embereknél fordul elő, különösen pedig falánk öregeknél és legtöbnyire emésztetlenség korjele. Nem mindig függ az étkek nagy mennyiségétől, mint inkább azoknak minőségétől, s a sajátsszenvtől — *idiosyncrasia* —, így némellyek a sertéshústól, mások a vadhústól, némellyek különféle italoktól, mint sertől bortól, ha nincsenek jól kiforrva, mások meg a haltól, rothadt hústól, különféle gyümölcsöktől, minő a dinnye még az ugorka s t. e. kaphatnak efféle hasmenést. Megelőzik pedig azt különféle előkórjelek, minők: feszült puffadt has étvágyhiány, émelygés. böfögés, ökröndözés néha emésztetlen anyag kihányása. Hasgörcsös fájdalom

mak bűdös szelek kiürítésével, e fájdalmak minden kiürítés előtt állanak be, és ekkor bő kiürítmény következik, pépállományu folyó és bélsárféle, mire könnyebbülés áll be; néha a kóros anyag kiürítése után megáll a hasmenés (*De ephemera*); másszor pedig hosszabb ideig tart, a kiürítmény savós, nyálkás, hozzá járul még láz is, s a beteg fölötte elsoványodik.

Ide sorozandó még a gyógyszeres hasmenés (*D. medicamentosa*), *drasticus* hashajtók, és más csipős mérgek által előhozatva, itt is nagy befolyást gyakorol a sajátszenv, ugyan is némelyeknél egy két szemer édes higany használatára is már székkiürítés áll be, míg mások a legnagyobb adagot is minden hatás nélkül eltűrik, s még a legerősebb hashajtók sem támadják meg.

Továbbá a lábadozók hasmenése (*D. reconvallescentium*), melly a lábadozóknál jön elő, és naponta délután 4—5 székletételre kényszeríti, azonban minden fájdalom és hasgöres nélkül, és egyenlő arányban van a bevett étkekkel. A beteg ereje nem növekszik innét látszik következni, hogy az étkek a gyomor munkásságától menten maradván, abban hosszabb ideig nem maradhatnak, és így mielőtt az étkek elkészítetténének a gyomron átmennek, mi valószínűleg ezen életmű zsonghiányától, vagy a tökéletlen emésztéstől függ; kitűnik ez a gyógmódból, melly mérsékelt mennyiségű ó, aszuszuló borban áll, s mi által a hasmenés megszüntetik.

Gyakran megtörténik, hogy olly embereknél, kik az előtt székszorulásban szenvedtek, hasmenés áll be, minden tudva levő ok nélkül; valamint az is, melly lobos bántalmakkal szövetkezik s azok bírálatát teszi.

A bélhuzam nyákhártyájának akár mennyi — akár minősileg megváltozott anyagok, epe, nyák, csorva, és férgek általi izgatása szinte gyakran hasmenést hoz elő.

Az épes hasmenés sugár barna egyéneknek szokott támadni, kikben a visszerrendszer kifejlett, inkább ta-

vasszal, ritkábban késő nyáron és őszi kezdetével. Többnyire 3—4 napig tart és gyakran szomjjal, a bőr szárazságával a tükhártya, meg orrszárnyak sárgás színezetével jár, a nyelv sárgás nyákkal van bevonva s a szájíz keserű és sokszor birálati. Az ilyen egyéneket minden évben megtámadja. Az alkalmi ok legtöbbnyire harag, de minden világos ok nélkül is támadhat. Hasgörcsös fájdalommal áll be, a kiürítmény kezdetben bélsárféle sárgás vagy zöldes, később folyó savós, nyákkal, meg pernyékkal vegyült, néha csipős, és égetést meg erősítést hoz elő, ha hosszabb ideig tart béllobot, vérhas és epés lázat szokott okozni.

A nyálkás hasmenés, mint már fentebb említők, a bélhuzam hurutja, többnyire tüdő huruttal párosul, úgy hogy ha ez kisebbül amaz növekszik, és viszont. A nyálkás hasmenés az alhas nyálkás állapotjának tünete, gyakran vérhas, s a bélhuzam nyálkahrtyájának más bántalmai után szokott visszamaradni, és legtöbbnyire agg és görvéllyes egyéneket támad meg.

Férges hasmenés, ezt a féregkór tüneteinek bélyegzik, orsóférges — ascarides — hozzák elő, és többnyire gyermekeknél támad, noha megletteknél is előfordul, és néha járványos.

A hasmenés gyakran a bélhuzam gyuladásának tünete, a kiürítmény majd savós, majd nyálkás, majd véres, majd genyes. Az ilyen esetekben mind a helybeli izgatottságra mind pedig az általános visszahatásra kell figyelmünket fordítani.

Az ideges hasmenés ideges egyéneket támad meg, főleg nőket; részt-meg idegkórosoknál szokványos. Kedélyi zavarok időváltozás, hideg és nagymennyiségű berzanyag (materia electrica), a légkörben azt előhozzák, sőt néha minden tudva levő ok nélkül fejlődik ki, (Párisban gyakran előfordul). A kiürített anyag nagy mennyiségű folyó, bűdös és gyakrabban visszatér a kiürítés, a

has feszült, puffadt, szelek, hasgörcsök, erőtetés és nehéz vizellet vannak jelen hányással, meg más görösös tüneteményekkel, minő a vizellet nehézség, vizelletcsepegés.

Ellenhatólag — antagonistic — támad a hasmenés, I-szór a bürrendszer meghütése által hideg viz ivás következtében ha a test felhevült, s a légmérséklet gyors változása miatt. Így támad a hurutos, csúzos meg savos hasmenés. Leggyakrabban és többnyire járványilag fordul elő tavasszal és ősszel. Gyakran követik a hasmenést alhasi hurutos meg csúzos kórjelek, szúró és vágó fájdalmak vannak jelen a hasban meg izmokban. A kiürítmeny ilyenkor kezdetben savos és pépsféle bélsárral vegyült, később megaludt és gyakran igen csipős. Lefolyása többnyire heveny és bírálati kiürítésekkel, minők: az izzadás, meg vizellet szokott végződni, vagy pedig béllobba és izomesuzba megy át, sokkal gyakrabban idült nyálkás hasmenéssé válik, különösen gyöngé görvélyes vagy hurutos bántalmakra hajlandó egyéneknél. A hasmenés e nemei meg az epés, rendetlen életű katonáknál szokott kifejlődni, és köztük többnyire háboru ideje alatt járványilag uralkodik, miért katonák hasmenésének mondatik.

Némelly helyeken az idegeneket többnyire hasmenés lepi meg, melly töbnyire kártékony befolyásokból, a víz minőségétől, sőt gyakran a hely fekvésétől s a légmérséklet változásától veszi eredetét. Az ilyen hasmenés olyan egyéneket támad meg, kik megszokták a folyóviz italt és kútvizet kénytelenek inni, így támad az idegeneknél hasmenés Párisban és Londonban megérkezésük első napjaiban. Kelet Indiában is helytálló járványként — endemice — uralkodik az ilyen hasmenés. Legujabb időkben a hasmenés ezen neme gőzhajókon a fűtőknél is tapasztaltatott.

Ellenhatólag támad továbbá a hasmenés a bőrrendszer nagyobb részeinek megégetése után, a bőrkütegek eltűnésével a szokványos elválasztások elnyomtatásával p. o. lábfekélyek, szokványos lábizzadások és fehérfo-lyás után. Észleltetett a hasmenés olly leányoknál kik-nél a havi tisztulás elnyomtatott, illy helyettesítő módon támadt hasmenést magam is tapasztaltam, hol minden hónapban midőn a havi tisztulásnak kellett volna meg-jelenni savós hasmenés állott be nyomdászerűleg — ty-pice —. A vizellet főnakadás — Ischuria — következté-ben néha a kiürítmény vizellet féle szagot kap, s ez vizelleti hasmenésnek mondatik.

Igen sokféle kórcsvegyes bántalom helybelisíti ma-gát a bélhuzam nyákhártyájára, és részint egyszerű iz-gatottságot, részint pedig anyagi rendellenes változást okoz a nyákhártyán, minek következtében aztán gya-kori és folyó állományu székkiürítmény áll be. Illyen a hagymázos hasmenés (D. typhosa), mint a hagymáz tüne-ménye; a genyes hasmenés a vérgenyes senyvénél, vagy midőn az alhasi életművek genyndésbe menvén át, tar-talmukat a belekbe ürítik ki. — Az olvasztó hasmenés, olvasztó — colliquativus — állapotban vízkórban, sorva-dásban, s a nedvek rothadó feloldozódásában fordul elő. Gyermekágyas hasmenés, melly a szülés után vagy közvetlenül vagy csak néhány nap mulva támad, és vagy a meggyült megkeményült, és terhesség ideje alatt ki nem ürített bélsár kóros izgatása, vagy pedig a bél-huzamba ürített kóros termények által, mint a tej és gyermekágyi tisztulás elnyomtatása után szokott történni, hozatik elő. A váltó hasmenés váltóláz formájában szo-kott előfordulni, mint ezt nálunk a Tisza mellékein ta-pasztalhatni, különösen árvizek után, midőn a nedves időjárás áll be, váltó vérhasba megy át. A köszvényes hasmenés gyakran birálati, e kiürítményekkel ugyan is a köszvényes anyag is kiürítettik és voltak esetek, mi-

dön az efféle hasmenés megszűntével a köszvény ismét lábrakapott. Az aranyeres hasmenés sat.

Életművi változások is hozhatnak elő hasmenést, a bélhuzam nyákhártyájának kifelégyedése bélgümőkór és más elfajulások által, minő p. o. a gyomor sipolyos közlekedése a hurkabéllel s a t. A kifelégyedéssel járó hasmenés különféle heveny és idült bántalmak következménye lehet, mint a hagymázé bélgümőkór és a vérhasó s a t. miket itt leírni fölösleges volna. Minden idült hasmenés a hám — epithelium — ismételt gyors lehámlása által kifelégyedésbe mehet át, minthogy a hám visszapótlása olly hamar nem történhetik mint annak elválása. Az efféle kifelégyedéssel járó hasmenésben a kiürítmény többnyire nyálkás genyes és véres pontokkal bélyegzett, ha savós, fehérsavós pernyékkal és hártyás részecskékkel vegyült. A kiürítmény néha bűdös, sötétszínű pépálománu máskor különféle létrészekből összetett folyadékot képez, és csak a legritkább esetekben szokott a feloldott vértől fekete lenni.

Előjöhet a hasmenés a bélhuzam izomrostjainak szélhűdéssel (szélhűdéses hasmenés), midőn is a nyelv halvány, az érverés gyöngye és lassu, a has lágy és fájdalomatlan, székkiürítésre a beteg gyakran érez egymás után ingert, néha azonban öntudat nélkül történik a kiürítés, melly legtöbbnyire savós. E hasmenés éjjeli szokott lenni és gerinczagybántalmakban szenvedő öregek-nél előfordul.

Lefolyás.

A lefolyás vagy heveny, vagy idült, amaz egy napos is lehet. Átalában a hasmenés rövid ideig tart azonban néha hónapokig, sőt éveken át is elhúzódik és szokványossá válhatik. Voltak esetek hol az idült hasmenés rendetlen enyhüléssel egész életen át tartott.

K i m e n e t e l.

A hasmenés leggyakrabban egészségbe megy át. Néha üdvös és bírálati a hasmenés, mi több heveny betegség lefolyása alatt észlelhető, mint a himlő genyeredési időszakában s a t. Sőt igen sok időlt betegségben is üdvös hatása van a hasmenésnek. Megismerhető pedig a bírálati hasmenés annak összefüggéséből az előbbi bántalommal, vagy a még jelenlevővel; annak a bírálatok ideje alatti előjöttéből, s azon bekövetkező változásokból, melyek a betegen feltűnnek. A csorvás, epés és kisdedkori hasmenés is többnyire üdvös. Valamint a heveny hurutos bántalmak, szintugy lefolynak a hasmenések is minden egyenesen megállító gyógyszerek használata nélkül. Gyakran székszorulás követi a hasmenést.

A hasmenés hosszabb tartása által az életművezet nemesebb nedvei elfogynak, és végre általános halvány-ságot, erőkimerülést és az érverés gyengülését hozza elő; az arczvonásai összeesnek, általános levertség, vértelenség, elszáradás és vízkor áll be; a bőr száraz és petyhüdt leszen, a vizellet elválasztása megkisebbül a fekélyek és genykutacsok kiszáradnak, a bélhuzam nyák-hártyája a folytonos csipős elválasztékok által mintegy fölmaratik, és ezen tartós izgatás következtében vagy kifekélyesedik vagy túltényeszik.

A tovább tartó izgatás által a hasmenés lobot, fekélyedést, vérhast, béllobot és hashártyalobot hozhat elő; gyakran az izgatás tovább terjed egész a savós hártyáig, s ekkor aztán hasvízkórt idéz elő, melly a hasmenéssel fölváltva fordulhat elő. Kisdedeknél a hasmenés kimenetele többnyire görcsökben s a vékonybél betüremelésében szokott állni.

K ó r j ó s l a t.

Már fentebb említők, mikép a hasmenés üdvös hatásu, az az bírálati is lehet s hogy másszor ismét több

utóbajokat hagyhat maga után. Az egyéniséget illetőleg; az öregeknél sokkal korlátozottabb a hasmenés jóslata mint ifjaknál, mert a hasmenés elnyomatván hirtelen fullasztó hörghurut támadhat náluk. Az alkalmi okokat figyelembe véve, az eledelek által előhozott hasmenés legkevésbé veszélyes ez pusztá kiürítés által gyógyul meg. Ha azonban erős csipős méreg vétetett be akkor természetes, hogy az ekkint támadt hasmenés is a legveszedelmesebb sőt gyakran halálos. Az életműves bántalmak vagy pedig kifekélyedés által fentartott hasmenés mindig halálos kimenetelű. Az olvasztó vagy gümös fekélyek által előhozott nem különben halállal végződik. Nem kevéssé rossz a jóslat akkor, midőn a hasmenés alatt a bélhuzam fenés állapotjára mutató kórjelek vannak jelen, minők a hányás, csuklás, kis érverés, a végtagok meghidegülése, és szélrekedés — meteorismus.—

G y ó g y m ó d.

Mindhogy a hasmenés legtöbb esetben kórjeles bántalom, innét az okbeli javallat a legfontosabb. Az eredeti bántalom és alkalmi okok különbsége szerint a gyógymód is módosítást szenved.

A kisdedek hasmenését, melly által igen gyakran ártalmas anyag ürítetik ki a testből vagy a melly hasznos elvonást eszközöl más életművektől nem kell rögtön elfojtani. Az okot kell igyekezni elhárítani, minő: a rossz tej, nehéz étel s a t. ajánlhatók ilyenkor a nyálkás s felszívó szerek, vagy magokban vagy rheummal. Ha a hasmenés idültté válik, akkor nyálkás keményítő csörék tojás sárgájával keverve használandók, bensőleg arabinézganyák kis mennyiségű mákonnyal adandó: vagy a hánytató gyökér kis adagban és meleg borongatások a hasra. mindenkor megvizsgálandó, vallyon nem béllob hozta-e elő a hasmenést, a mit a has hőségéből a bőr szárazságából és érdeségéből a vörös szegélyű

nyelvből s az érverés izgatottságából megismerhetni. Ekkor lobellenes gyógymódot kell használni, néhány nádály tétessék a hasra, ezek után pépborogatmány; ha kevésbé érzékeny a hasfürdők használtassanak, s bensőleg tompító nyálkás szerek adassanak. A soká tartó hasmenés ellen, mind különyszer ajánlatott Kopptól gyermekeknél az édes higany, s az óta igen sokaktól magasztaltatott. Csecsemőknek $\frac{1}{6}$ szemer adatik kétszer naponta. A Magisterium Bismuthi Recamiertől dicsérve 3 szemerkin naponta 2—3-szor. Az anyagföld fél te-recskin szörpben; a legélegsavas ezüstéleg — nitras argenti — $\frac{1}{4}$ szemerkin olvadékban bensőleg, és egy-szersmind csőrének készítve $\frac{1}{4}$ szemberből.

Ha a hasmenést mennyi vagy minőségileg hibás eledetek hozták elő, akkor a fentartandó szigorú életrend mellett, legfellyebb nyálkás bevonó főzetek, Salep, Ziliz, és árpából használandók. Ha a kiürítés csekély, enyhe hashajtókkal szükség azt előmozdítani, minők: a tamarindpép, Rheum vagy Senna forrázat bor-kövel, édes higany s. t. e.

Ha hasgörcsös fájdalmak vannak jelen, akkor olajos nyálkás vegyitek használandó, továbbá lágyító pépborogatmányok, meg lágyító csőrök alkalmazandók. Ha keveredés mutatkozik felfelé, hánytató gyökérből készített hánytató adassék; az első utak savanyodásánál felszívók használtassanak, illatos forrázatban, mint: a szénsavas hamag, szénsavas szikeg, mésvíz, szénsavas kesreg — Carbonates Kali, natri, magnesiae — ánis vagy fenyőmaggal és rheumfestvénnel. Ha a hasmenés túlságossá válnék, akkor a hánytató gyökér tört adagban használtassék, rheummal együtt, s ha ezek nem használnának, csak akkor alkalmaztassanak az erősebb hasmenést csillapító szerek.

Az epés hasmenést sem kell azonnal megállítani, mert a korán használt zsongítók s a mákony ártalma-

sak; sőt inkább azt, mint az előbbi szükség enyhe haszajtókkal fentartani, ha keveredés mutatkozik felfelé, a hánytató jó eleve használandó, sőt gyakran ismételni is szükséges azt. Az epe által előhozott izgatottságot nyákos szerekkel és lágyító csőrékkel szükség csillapítani, a hasgörcsös fájdalmakat a nagy hírű Richter javaslata szerint, leghamarább csillapíthatni citrónlével vagy eczettel, édes mandola olaj vegyítékben.

Az ideges vagy is szokványos hasmenést tompítók használatával, p. Dower porral állíthatni meg, vagy pedig illatos fodor ménta és zsálya forrázatokkal, meleg fürdőkkel, zsongító életrenddel, minő a sült hús eledel, s a jó ó bor vízzel vegyítve. E hasmenés gyakran magától is megáll, ha kedélyi ingerültség megszűnt. Az efféle hasmenés ellen az az óvszer, hogy az ilyen beteges egyén flanell ruhát hordjon, mellyel hasát közvetlen betakarja, lábait melegen tartsa, hasát többször dörzsölje, gyakran tegyen testi mozgást a szabad levegőben, a nehéz emésztési étkeket kerülje, s azokat, melylyek igen hamar forrásba mennek át, minők a zsíros ételek; gyomrát ne terhelje meg, sokat ne igyék, inkább erősítő étrendet tartson, ebédnél jó ó bort igyék, továbbá hideg mosásokat és hideg tengeri vagy folyóvízfürdőket használjon.

Az ellenhatólag támadt hasmenést az előbbi eltűnt bántalom visszaidézésével csillapítjuk le: ha meghűtés által hozatott elő, akkor az ágynak egyenlő melegét ajánljuk, lágymeleg italokat langyos borongatásokat a hasra, vagy Minderer szeszét vagy Dower porát adjuk bensőleg, bekenéseket beléndekolajjal, röpülő irral, terpentinelajjal. Ha ezen nem szerek elégségesek, akkor mustárpép és hólaghuzó alkalmazandó a hasra.

A koresvegyes hasmenésnél a javallat azt kívánja, hogy az eredeti bántalom vétessék figyelembe, így p. o. a köszvényes meg aranyeres hasmenés nem mindig el-

fojtandó, sőt néha fén is tartandó. A váltó nyomdāju hasmenés ellen legjobb szer a kénsavas kinal.

A szélhűdéses hasmenés zsongító szereket kíván minő: bensőleg a kina, és csőrében a Hufelandtól annyira dicsért ebvész mag — *nux vomica* — továbbá *arnica*, *Islandiai moh*, és *polygala*.

Az elfajulásokból, kifekélyedésekből támadt hasmenés csupán palástoló gyógymódot kíván, nyálkás főzetek bensőleg és csőrében is használtattak a gümőkórosok hasmenése ellen, Stokes hólyaghuzót ajánl a hasra. A legelégsavas ezüstéleg és ólomczukor legtöbbet tesznek ez esetben.

Há az okbeli javallatnak némelly esetekben eleget nem tehetni, vagy ha a használt gyógymód nem elégséges, ha a hasmenés már többé nem bírálati, hanem inkább a beteg kárára van, és ha annak elnyomatásától semmi utóbajok sem származhatnak; akkor szükség csak a kórjavallatnak eleget tenni, s a hasmenés elleni egyenes gyógymódot alkalmazni, ez azonban szinte több mozzanatokra — momentá — oszlik, mellyek szerint szükség a gyógymódot intézni.

Az első javallat abban áll, hogy a bélhuzam izgatottsága lecsillapíttassék, mit az által érhetni el, midőn az elválasztékok csipős minőségét enyhítjük felszívók, mésvíz, tisztázott, agyag föld, szénpor, nyálkás szerek, mézgafélék által, minő a Salepfőzet, Sydenhám fehér főzete, és mandoláolaj vegyíték, tej nyálka vagy keményítőből és tojas sárgájából készített csőrek stb. Ez mind hasmenés elleni szerül tekintendő. Enyhébb lefolyásu esetekben elégségesek, sőt ott is használhatók, hol a hasmenés természete kétséges. A hájas hasmenésben, a mandola olaj Eliotsontól igen ajánlatott s ez legtöbb is használt.

A bélhuzam érzési idegeinek közvetleneltompítása által, minők a tompítók: mákony, beléndek, bóróstyán-medgyvíz, szepnőnye stb. szinte elnyomhatni a hasmenést. — Továbbá meleg fürdők, borongatások, tompító mosások, és tompító kenőcsök, a szűnyal a külbőrre alkalmazva Richtertől nagy mértékben ajánlatik. Hol a beteg tévőleges mozgásai csillapítandók, ott az ebvésmag, strichnin $\frac{1}{12}$ szemertől kezdve kétszer naponta, ólomczukor és hánytató gyökér legjobb hatású szerek.

A második javallat azt kívánja, hogy a bélhuzam elválasztási működése zsongító és összehúzó szerek által egyenesen lehángoltassék. Azonban figyelmet igényel azon körülmény, nehogy izgatott állapot legyen jelen, különben az efféle szerek könnyen gyuladást idézhetnek elő. És így ott vannak leginkább javallva, hol a bélhuzam nyákhártyájának zsonghiánya, vagy is inkább szeri-vedőleges kóros izgékony-sága vagyon jelen. Ezen javallatnak megfelelő szerek a következők: Rheum, islandiai moh, arnica gyökér Colombo, Cascarillahéj, rattannia gyökér s több ismert zsongítók, továbbá a Creosot, Cubebubors, monoesia vonadék, kino-mézga. Catechu, Tanintimsó, sósavas, — kénsavas vas, ólomczukor, legélegsavas ezüstéleg, kénsavas rézeleg, kénsavas kinal, jóféle budai vörös ó bor. Az említett szerek közül legtöbb akkint hat, a mennyiben a kórosan megváltozott bélhuzam nyákhártyáját ideiglenesen izgatván azt megmástitják. A hol ezek sem használnak, néha már a drásticos hashajtók is hoztak sükert elő, minő a gumi-gutta, jalappa stb.

Néha más elválasztó életművek ellenhatásos izgatása, minő az émelygés, hányás, a hasmenést megszünteti; ekkor a tört adagban használt hánytató gyökér a legjobb szer. Ugyanezen javallatból néha izzasztók is használtassanak.

Az életrendre is nagy figyelmet kell fordítani a hasmenések gyógyításánál, mellyek magokban is gyakran a legmakacsabb hasmenést megszüntetik. A heveny esetekben csupán a riskása lé, és árpafőzet használandó idült eseteknél pedig az mind eltiltandó, mi a hasmenést öregbithetné, minők: a' gyümölcs főzelék, tej, hideg víz ital stb. Inkább szigorú életrend riskása, tojás, csokoládé ajánltassék. A hol össze huzók használtatnak, ott könnyen emészthető hús is ajánlható jó ó borral együtt. Kerülje a beteg a meghűlést, s az utazás is nagy mértékben hasznára leend a betegnek.

T H E S E S.

1. **D**iarrhoea non est morbus, sed solnm symptoma morbi,
 2. Medicus, qui bene individnalisare non novit, bonus practicus evadere nequit.
 3. Cognitio morborum localium in genere plus contribuit pro diagnosi stabilieuda, quam therapia speciali dirigenda. Hinc est:
 4. Quod dantur multi medici, qui cognitionibus pathologico — anatomicis destituti feliciores, et omni respectu meliores quoque sunt practici medici, quam mlti localium processuum morbosorum cognitione saturati, sed vera ad lectum aegrorum observandi capacitate destituti et localisationibus saepissime in errorem inducti.
 5. Reformatio vera medicinae a politia medica foret incipienda.
 6. Medicus curat, natura sanat; ideo
 7. Pharmacologia ex asse esset restauranda.
 8. Divisio juxta formas in Dermatopathologia, plus contribuit ad diagnosim stabiliendam, quam therapiam dirigendam.
 9. Favus verus, non est parasita, sed est productum discrasiae tuberculosae.
 10. Typhus abdominalis nonnisi difficillime ad lectos aegrorum a tuberculosi acuta miliari distingvi valet.
 11. Venaesectio in amaurosi saepius optimum remedium suppeditat.
-

